



**SÜDTIROLER  
IMKERBUND**

Bezirk Bruneck

## Terminplan für die Varroabekämpfung 2019

Die Termine gelten bei normalem Wetterverlauf.

Bei länger anhaltender Tracht ist die Behandlung um eine oder auch mehrere Wochen zu verschieben. Für die Details der Behandlungen siehe die Broschüre zur Varroabehandlung des SIB.

Für den Erfolg der Varroabekämpfung eines jeden Imkers ist es sehr wichtig, dass alle Imker eines Gebietes die Bekämpfung **gleichzeitig** machen. Nur so kann eine Reinvansion verhindert werden. Daher ersuchen wir alle Imker, den vorgeschlagenen Zeitplan möglichst genau einzuhalten. Wichtig ist, **dass zwischen 15. und 25. Juli alle Bienenvölker varroafrei** gemacht werden.

Mitte Juni den natürlichen Varroaabfall feststellen. Falls mehr als 30 Milben /Tag abfallen: Sofort die gesamte Brut entfernen und mit API-BIOXAL behandeln!

### **Methode A: Absperren der Königin oder Bannwabenverfahren:**

21. - 26. Juni: - Absperren der Königin in die unterste Einheit oder in einer Bannwabe

15. - 20. Juli: - Ende der Schleuderung  
- Entfernen und Vernichten der Bannwaben  
- Freisetzen der Königin in der untersten Zarge  
- Herrichten des Wintersitzes. Entfernen der alten Waben.  
- Eventuell: Entfernen der alten und Zusetzen der neuen Königinnen.  
- Behandlung mit API-BIOXAL  
- Füttern

### **Methode B: Totale Brutentnahme mit Fangwabe:**

06.Juli. bis 11 Juli: -Totale Brutentnahme; eine Wabe mit viel offener Brut als Fangwabe belassen.  
- Bei geringem Varroadruck können mit den entnommenen Brutwaben Sammelbrutableger gemacht werden (20 Brutaben je Ableger).

15.- 20. Juli: 9 Tage später: - Fangwabe entfernen und vernichten  
- Schleuderung  
- Danach Behandlung mit API-BIOXAL  
- Die Sammelbrutableger 24 Tage nach Bildung mit API-BIOXAL behandeln.

**Andere Methoden** (Es können auch andere Methoden angewandt werden),  
z.B. Behandlung mit dem Ameisensäurepräparat **APIFOR60** nach der Schleuderung.

Bis Ende Oktober alle 14 Tage den **Varroabfall** feststellen. Bei Abfall von mehr als 3 Milben/Tag nach Beendigung der Auffütterung in alle Völker Apilife einhängen.

Oktober/November/Dezember **Restentmilbung** mit API-BIOXAL . Alle Völker auf Brutfreiheit kontrollieren. **Bei Brutfreiheit mit API-BIOXAL behandeln.**

Weiters erinnert der Bezirksausschuss daran, dass alle Imker die Varroabekämpfung im **Behandlungsregister** protokollieren müssen.

#### Anwendung des **API-BIOXAL** :

35 g Packung: Mit 309 ml Wasser und 309 g Zucker verrühren. Dies reicht für 10 Völker.

175 g Packung: Mit 1543 ml Wasser und 1543 g Zucker verrühren. Dies reicht für 50 Völker.

**Dieser vom Bezirk Bruneck verfasste Varroabekämpfungsplan dient als Anleitung für eine erfolgreiche Varroabekämpfung. Für die erfolgreiche und fachgerechte Varroabehandlung seiner/ihrer Bienenvölker ist jeder Imker/in selbst verantwortlich.**

Bruneck, am 10. 04 2019

Der Bezirksausschuss Bruneck